

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Sexe :  M  F

Nom de naissance : \_\_\_\_\_ Date de naissance : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Si mineur : Nom tuteur \_\_\_\_\_ Prénom tuteur \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Numéro de sécurité sociale : \_\_\_\_\_

Prélèvement effectué par \_\_\_\_\_

le \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ à \_\_\_ h \_\_\_

**Examens demandés (ou joindre l'ordonnance) :**

Nom du Prescripteur : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Grossesse :  oui  non

Traitement en cours :  oui  non  antibiotique  antiparasitaire  antimycosique

Si oui, lequel : \_\_\_\_\_

### LOCALISATION DU PRELEVEMENT

<b>FEMME</b>	<input type="checkbox"/> Vaginal	<input type="checkbox"/> Endocol/Cervico-vaginal	<input type="checkbox"/> Vulvaire
<b>HOMME</b>	<input type="checkbox"/> Urétral	<input type="checkbox"/> Écoulement	<input type="checkbox"/> Prépuce/Gland, verge

**Transmettre le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible**  
(Stabilité après prélèvement : 48h à température ambiante)



### INSTRUCTIONS DE PRELEVEMENT (Sources : Rémic 2018)

#### Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser le prélèvement

Prélever **un seul écouvillon Eswab** par origine de prélèvement pour les recherches suivantes :

- Bactériologie standard : germes banals
- Recherche par PCR : Chlamydiae trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasmes urogénitaux, Mycoplasma genitalium et Trichomonas vaginalis par PCR.

Attention : pour la recherche d'herpès génital par PCR un **kit M4RT** (sur demande au laboratoire) est nécessaire. Le prélèvement doit être effectué à l'écouvillon après avoir rompu les vésicules fermées.

Sexe	Type d'écouvillon	Modalités de prélèvements	Précautions pré-analytiques
♀		<p>Vaginal sans spéculum : introduire l'écouvillon sur une distance de 3cm et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. S'assurer que l'écouvillon touche les parois du vagin. Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.</p> <p>Vaginal avec spéculum : prélever au niveau des lésions ou au niveau des leucorrhées anormales. En l'absence de lésion : recueillir les sécrétions en balayant l'ensemble de la cavité vaginale.</p> <p>Endocol (spéculum obligatoire) : après nettoyage du col, réaliser le prélèvement en insérant l'extrémité de l'écouvillon (environ 1 cm) dans l'endocol et le faire tourner doucement. Attention à ne pas toucher les parois du vagin en retirant l'écouvillon.</p>	<p>Pas de rapport sexuel dans les 24h précédant le prélèvement</p> <p>Pas de crème ou ovule intravaginal dans les 48h (au moins 7j si ovule antimycosique à libération prolongé LP)</p> <p>Pas de traitement antibiotique per os récent (au moins 5j pour les germes banals et 15j pour la recherche de chlamydia)</p> <p>Prélèvement déconseillé pendant les règles en lien avec la modification temporaire de la flore</p>
♂		<p>Urétral : introduire l'écouvillon fin au niveau du méat urétral sur <u>1 cm</u>, faire une légère rotation contre les parois</p> <p>Si écoulement : juste prélever la <u>goutte</u></p>	<p>Prélèvement à effectuer avant un recueil d'urines si associé et au moins 2h après la dernière miction</p>

Fermer soigneusement le flacon et identifier le avec votre **Nom, Prénom** et **Date de naissance**.