

Cet examen doit être réalisé au laboratoire

- Le médecin prescrit 2 ordonnances :
 - L'une pour la récupération du test en pharmacie (Helikit® ou Infai®)
 - L'autre pour sa réalisation au laboratoire.

Attention : se rendre au laboratoire avec le test acheté à la pharmacie.

- La durée de présence au laboratoire est de 30 minutes après le début du test (sans manger ni boire ni fumer pendant l'épreuve).

Conditions pré-analytiques à respecter :

- Être obligatoirement à jeun (n'ayant ni bu (eau y compris), ni mangé depuis au moins 10 heures)
- Le brossage des dents est autorisé
- Ne pas avoir fumé (depuis au moins 10 heures)
- Ne plus être sous traitement antibiotique depuis au moins 1 mois¹ (cf page 2)
- Ne plus être sous traitement anti-sécrétoire gastriques ² (inhibiteur de la pompe à proton IPP, anti-histaminiques H2 et autres antiulcéreux) depuis au moins 15 jours (cf page 2)
- Avoir arrêté anti-acides et pansements gastro-intestinaux 24h avant le test³ (cf page 2)

Le test doit se pratiquer :

¹ 1 mois après l'arrêt de tout traitement antibiotique	² 15 jours après l'arrêt des anti sécrétoires gastriques			³ 24h après l'arrêt des anti-acides et pansements gastriques
Clarithromycine Amoxicilline Métronidazole Tétracycline Levofloxacin ...	Inhibiteurs de la pompe à protons ou IPP	Anti-histaminiques H2	Autres antiulcéreux	ACTAPULGITE, ACRIDINE, BEDELIX, BOLINAN, CONTRACIDE, DIGESTIF, MARGA, GAVISCON, GELOX, GELUSIL, GASTROPULGITE, ISUDRINE, KAOMUTH, MAALOX, MOXYDAR, MUTESA, NEUTROSES, PEPSANE, PHOSPHALUGEL, POLY-KARAYA, POLYSILANE, RENNIE, RIOPAN, ROCGEL, SILIGAZ, SMECTA, XOLAAM
	Lansoprazole LANZOR, OGAST, OGASTORO Oméprazole MOPRAL, ZOLTUM Esomeprazole INEXIUM Pantoprazole EUPANTOL, INIPOMP Rabéprazole PARIET	Ranitidine AZANTAC, RANIPLEX Famotidine PEPDINE, PEPCIDAC, PEPCIDDUO Nizatidine NIZAXID Cimétidine TAGAMET, STOMEDINE	Misoprostol CYTOTEC, GYMISO Sucralfate KEAL, ULCAR	