

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Autoprélèvement effectué le ____ / ____ / ____ à ____ h ____

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Grossesse : oui non Si oui DDR : ____ / ____ / ____

Traitement en cours : oui non antibiotique antiparasitaire antimycosique

Si oui, lequel : _____

Date du dernier frottis du col : ____ / ____ / ____

GUIDE DE PRELEVEMENT :

Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

FIGURE 1



- Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon et le tube.
- Enlevez l'écouvillon du sachet sans toucher le coton, ni le reposer.
- Tenir l'écouvillon comme le montre la figure 1, en le plaçant entre le pouce et l'index au milieu de la tige.

FIGURE 3



- Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
- Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube (milieu de transport) : le coton touche le fond du tube.
- Cassez la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord (figure 3).

FIGURE 2



- Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance de 3 cm (figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes.
- Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
- Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

FIGURE 4



- Revissez le bouchon (figure 4).
- Après avoir bien refermé le tube, conservez-le à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans un délai de 24 heures (48 heures maximum).

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Autoprélèvement effectué le ____ / ____ / ____ à ____ h ____

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Grossesse : oui non Si oui DDR : ____ / ____ / ____

Traitement en cours : oui non antibiotique antiparasitaire antimycosique

Si oui, lequel : _____

Date du dernier frottis du col : ____ / ____ / ____

GUIDE DE PRELEVEMENT :

Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

FIGURE 1



- Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon et le tube.
- Enlevez l'écouvillon du sachet sans toucher le coton, ni le reposer.
- Tenir l'écouvillon comme le montre la figure 1, en le plaçant entre le pouce et l'index au milieu de la tige.

FIGURE 3



- Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
- Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube (milieu de transport) : le coton touche le fond du tube.
- Cassez la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord (figure 3).

FIGURE 2



- Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance de 3 cm (figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes.
- Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
- Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

FIGURE 4



- Revissez le bouchon (figure 4).
- Après avoir bien refermé le tube, conservez-le à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans un délai de 24 heures (48 heures maximum).