

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F
 Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____
 Si mineur : Nom tuteur _____ Prénom tuteur _____
 Adresse : _____
 Tél. : _____ E-mail : _____
 Auto-prélèvement effectué le ____ / ____ / ____ à ____ h ____

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Grossesse : oui non Si oui date des dernières règles : ____ / ____ / ____

Traitement en cours : oui non antibiotique antiparasitaire antimycosique

Si oui, lequel : _____

GUIDE DE PRELEVEMENT :

Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

FIGURE 1


- Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon et le tube.
- Enlevez l'écouvillon du sachet sans toucher le coton, ni le reposer.
- Tenir l'écouvillon comme le montre la figure 1, en le plaçant entre le pouce et l'index au milieu de la tige.

FIGURE 2


- Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance de 3 cm (figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
- Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

FIGURE 3


- Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
- Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube (milieu de transport) : le coton touche le fond du tube.
- Cassez la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord (figure 3).

FIGURE 4


- Revissez le bouchon (figure 4).
- Après avoir bien refermé le tube, conservez-le à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans un délai de 24 heures (48 heures maximum).

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F
 Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____
 Si mineur : Nom tuteur _____ Prénom tuteur _____
 Adresse : _____
 Tél. : _____ E-mail : _____
 Auto-prélèvement effectué le ____ / ____ / ____ à ____ h ____

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Grossesse : oui non Si oui date des dernières règles : ____ / ____ / ____

Traitement en cours : oui non antibiotique antiparasitaire antimycosique

Si oui, lequel : _____

GUIDE DE PRELEVEMENT :

Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

FIGURE 1


- Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon et le tube.
- Enlevez l'écouvillon du sachet sans toucher le coton, ni le reposer.
- Tenir l'écouvillon comme le montre la figure 1, en le plaçant entre le pouce et l'index au milieu de la tige.

FIGURE 2


- Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance de 3 cm (figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
- Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

FIGURE 3


- Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
- Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube (milieu de transport) : le coton touche le fond du tube.
- Cassez la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord (figure 3).

FIGURE 4


- Revissez le bouchon (figure 4).
- Après avoir bien refermé le tube, conservez-le à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans un délai de 24 heures (48 heures maximum).