



Recherche d'Oxyures par SCOTCH-TEST

FOR-MU-PREPO-064-v01
Date d'application : 12/08/22
Visa Qualité : CLFL
1/1

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ___ / ___ / ___

Si mineur : Nom tuteur _____ Prénom tuteur _____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Prélèvement effectué par _____ le ___ / ___ / ___ à ___ h ___

MERCI DE REpondre AUX QUESTIONS SUIVANTES :	OUI	NON
Troubles intestinaux : douleurs abdominales, diarrhées, ... ?		
Prurit anal nocturne (démangeaisons) ?		
Troubles nerveux, troubles du comportement ?		
Vulvovaginite chez la fillette ? (le prélèvement peut alors se faire au niveau de la vulve)		

Examens demandés (ou joindre l'ordonnance) :

Nom du Prescripteur : _____

Date : ___ / ___ / ___

Signature : _____

Instructions pour effectuer le prélèvement (le port de gants est obligatoire) :

- Le prélèvement doit être réalisé **le matin au lever avant la toilette et les premières selles.**
- Matériel nécessaire : scotch transparent (2 bandes de 5 cm environ), lames en verre, porte-lame
- Appliquer le côté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale, appuyer quelques secondes (bien déplier la marge anale)
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame sans faire de bulles d'air
- Recommencer avec le deuxième scotch
- Placer les lames dans le porte-lame, **identifier l'étui**, placer-le dans un sachet de transport double poche et fermer le sachet (attention le prélèvement peut être contagieux)

Délai d'acheminement au laboratoire : 24h à T°C ambiante.

Transmettre le(s) lame(s) au laboratoire après avoir rempli la fiche de renseignements



Recherche d'Oxyures par SCOTCH-TEST

FOR-MU-PREPO-064-v01
Date d'application : 12/08/22
Visa Qualité : CLFL
1/1

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ___ / ___ / ___

Si mineur : Nom tuteur _____ Prénom tuteur _____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Prélèvement effectué par _____ le ___ / ___ / ___ à ___ h ___

MERCI DE REpondre AUX QUESTIONS SUIVANTES :	OUI	NON
Troubles intestinaux : douleurs abdominales, diarrhées, ... ?		
Prurit anal nocturne (démangeaisons) ?		
Troubles nerveux, troubles du comportement ?		
Vulvovaginite chez la fillette ? (le prélèvement peut alors se faire au niveau de la vulve)		

Examens demandés (ou joindre l'ordonnance) :

Nom du Prescripteur : _____

Date : ___ / ___ / ___

Signature : _____

Instructions pour effectuer le prélèvement (le port de gants est obligatoire) :

- Le prélèvement doit être réalisé **le matin au lever avant la toilette et les premières selles.**
- Matériel nécessaire : scotch transparent (2 bandes de 5 cm environ), lames en verre, porte-lame
- Appliquer le côté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale, appuyer quelques secondes (bien déplier la marge anale)
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame sans faire de bulles d'air
- Recommencer avec le deuxième scotch
- Placer les lames dans le porte-lame, **identifier l'étui**, placer-le dans un sachet de transport double poche et fermer le sachet (attention le prélèvement peut être contagieux)

Délai d'acheminement au laboratoire : 24h à T°C ambiante.

Transmettre le(s) lame(s) au laboratoire après avoir rempli la fiche de renseignements